JOURNAL

M. de Brande

OBSERVATIONS

SUR

LA PHYSIQUE, SUR L'HISTOIRE NATURELLE ET SUR LES ARTS,

AVEC DES PLANCHES EN TAILLE-DOUCE;
DÉDIÉES

A M. CHARLES-PHILIPPE, PRINCE FRANÇOIS;

PAR M. l'Abbé ROZIER, de plusieurs Académies; par
M. J. A. MONGEZ le jeune, Chanoine Régulier de Sainte
Geneviève, des Académies Royales des Sciences de Rouen,
de Dijon, de Lyon, &c. & par JEAN-CLAUDE DELA-
MÉTHERIE, Docteur en Médecine, de l'Académie des Sciences,
Arts & Belles-Lettres de Dijon, de l'Académie des Sciences
de Mayence, de la Société des Curieux de la Nature de Berlin,
de la Société des Sciences Physiques de Lausanne, de la Société
Royale de Médecine d'Edimbourg, de la Société pour l'encou-
ragement des Arts à Londres, &c.

JANVIER 1792.

TOME XL.

A PARIS,

AU BUREAU du Journal de Physique, rue & hôtel Serpente

Et se trouve

A LONDRES, chez JOSEPH DE BOFFE, Libraire, Gerard-Street, N°. 7, fohe

M. DCC. XCII.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY.

JOURNAL DE PHYSIQUE.

MARS 1792.

ANALYSE

DE LA DOLOMIE,

Par M. DE SAUSSURE le fils.

L'EFFERVESCENCE lente & presque insensible que donnent avec les acides certaines pierres calcaires, est un fait sur lequel M. le commandeur de Dolomieu vient de réveiller l'attention des minéralogistes dans une Lettre très-intéressante à M. Picot de la Peyrouse (*Journal de Physique* 1791).

M. Fleuriau de Bellevue a eu la bonté de me donner au retour de son voyage dans le Tyrol, quelques morceaux de cette substance; jusqu'à présent peu connue, & M. de Dolomieu, à qui je me suis adressé ensuite, m'a envoyé de superbes échantillons de ses principales variétés.

Cette pierre mérite à tous égards d'avoir un nom particulier, celui de *Pierre calcaire peu effervescente* est indéterminé & impropre. On ne sauroit mieux la baptiser, qu'en dérivant son nom de celui du célèbre naturaliste qui nous l'a fait connoître.

M. de Dolomieu a reconnu cette pierre dans quelques monumens de l'ancienne Rome & dans les lits des torrens qui prennent leur origine dans les Alpes; il l'a vue en place dans les montagnes du Tyrol. Linnæus qui connoissoit la dolomie, nous apprend qu'elle se trouve à Roedberg en Norwege; il lui donna le nom expressif de *Marmor tardum*, en la définissant ainsi: *Marmor particulis subimpalpabilibus album diaphanum. Hoc simile quartzo, durum, distinctum quod cum aqua forti non, nisi post aliquot minuta & sero, effervescens.*

Je dois prévenir d'avance qu'il ne faut point la confondre avec le spath perlé, soit manganésien, ni avec certaines mines de fer spathique, qui n'ont, à la lente effervescence près, aucun rapport avec la pierre dont il s'agit ici.

Caractères extérieurs de la Dolomie.

Les caractères extérieurs de la dolomie ne sont pas toujours assez tranchés & assez constans pour pouvoir servir seuls à la faire reconnoître.

Tome XL, Part. I, 1792. MARS.

Y

Je ne l'ai point encore vue sous une forme cristalline déterminée : le grain satin qu'elle a très-souvent, semble indiquer cependant qu'elle en est susceptible, son tissu est plus ferré que celui des pierres calcaires généralement connues, d'ailleurs sa texture suit celle de presque toutes leurs variétés ; elle est susceptible de prendre un beau poli.

La dureté de cette pierre est plus grande que celle des marbres ordinaires, elle va quelquefois jusqu'à donner des étincelles avec le briquet, quoiqu'elle ne contienne pas un atôme de terre siliceuse. L'acier trempé l'entame difficilement ; le fer forgé & le laiton y laissent leurs traces métalliques. Sa cassure paroît avoir de la disposition à la forme conchoïde.

La couleur de la dolomie passe par les variétés suivantes, blanc de lait, brun clair, jauné roux, gris & rougeâtre. Ces couleurs qui ne sont jamais bien foncées, tiennent aux différens états du fer, qui se rencontre toujours en petite quantité dans cette pierre. La surface ne change pas sensiblement de couleur par son exposition à l'air libre & à la lumière.

Sa pesanteur spécifique surpasse celle de tous les marbres que M. Brisson a éprouvés ; la pesanteur moyenne de quatre variétés différentes est 2,850.

La dolomie que j'ai soumise aux différens essais dont je parlerai bientôt, vient du Tyrol. Sa pesanteur spécifique est 2,862 : elle a le grain satin, & la blancheur du marbre blanc statuaire de Carrare ; elle est phosphorique par collision sans donner cependant des étincelles avec le briquet.

Sa phosphorescence par collision, ainsi que l'a observé M. de Dolomieu, n'est pas un caractère qui soit essentiel à la dolomie, ni qui appartienne exclusivement à quelques-unes de ses variétés ; car M. l'abbé Fortis & M. de Laumont ont trouvé que plusieurs marbres très-efforescens avoient cette propriété.

Je n'entreprendrai point de remonter à la première cause de ce phénomène, ou de rechercher si la phosphorescence par collision est due ici à la décomposition de la pierre même, ou à un effet de l'électricité, ou à celui de l'incandescence à laquelle les parties frottées peuvent parvenir par le mouvement qu'on y excite ; mais je remarquerai que cette phosphorescence ne tient pas tant à la dureté qu'à la texture de la substance qui est disposée par sa composition à produire le phénomène dont il s'agit. Ainsi j'ai vu plusieurs dolomies très-dures, qui n'étoient point phosphoriques par collision, tandis que d'autres beaucoup moins dures étoient douées de cette qualité dans un degré très-éminent. L'analyse chimique ne démontroit aucune différence entre ces variétés ; mais les premières avoient un grain très-serré & très-fin : les secondes un grain plus rude & plus relâché. Il est donc possible que toutes les dolomies aient essentiellement la propriété de pouvoir être phosphorescentes, mais que toutes ne le soient pas, parce que leur tissu ne se présente pas toujours de manière à produire cet effet.

J'ai fait quelques expériences qui sembleroient venir à l'appui de cette opinion, plusieurs morceaux de marbre, soit blanc, soit coloré, qui ont été enduits d'acide phosphorique retiré du verre phosphorique tombé en déliquescence, n'ont donné, après avoir été desséchés dans un creuset à une douce chaleur, aucun signe de phosphorescence par le frottement, tandis que plusieurs échantillons de craie ordinaire traités au même feu & avec le même acide que les marbres de l'expérience précédente, lançoient de grands traits de lumière lorsqu'on les frottoit avec une plume. Cette craie phosphorée dépouillée de la mince couche vitreuse qui s'étoit formée à sa surface, conservoit encore sa même qualité phosphorique, & elle paroissoit être extérieurement de la même nature que la craie parfaitement pure.

La lumière produite par la collision doit être, toutes choses d'ailleurs égales, d'autant plus abondante que les corps d'où elle peut se dégager donnent plus de prise au frottement, ou que les élémens de la substance frottée présentent plus d'aspérités. Ne pourroit-on pas supposer que dans la craie dont le tissu est relâché, le phosphore calciné ait assez de place pour se cristalliser de manière à présenter beaucoup d'aspérités, tandis que dans le marbre dont le tissu est compacte & serré, cette cristallisation intérieure ne sauroit avoir lieu. Le phosphate calcaire cristallise très-facilement par la voie sèche. J'ai obtenu en décomposant du gyps avec du verre phosphorique à un très-grand feu de fusion, un sel d'un blanc verdâtre, formé de lames prismatiques souvent striées, superposées les unes aux autres, & coupées quatrément à leurs extrémités; ce sel est très-phosphorique par le frottement avec la plume.

Action du feu sur la Dolomie.

La dolomie exposée à l'extrémité d'un tube de verre à la flamme du chalumeau ne s'est pas entièrement fondue, mais elle s'est vitrifiée à sa surface sans changer de couleur. Cette pierre pulvérisée a été soumise dans un creuset de platine à un très-grand feu sans subir aucune fusion, les molécules se sont cependant légèrement aglutinées, la blancheur n'a pas été altérée, elle a perdu la 0,462^e de son poids. Une dolomie de couleur jaune, qui donnoit du feu avec le briquet, & dont le grain n'étoit pas soûlé a été exposée au même feu, elle a blanchi, & elle a perdu la 0,47^e de son poids. Le spath perlé rhomboïdal, blanc, à demi-transparent s'est changé par cette opération en une scorie noire, il a perdu la 0,455^e de son poids, & le marbre blanc statuaire de Carrare la 0,425^e. On voit par ces essais que la dolomie n'est pas composée uniquement de terre calcaire aérée, puisqu'elle s'est un peu vitrifiée au chalumeau. On voit encore qu'elle est une des pierres calcaires, qui souffre le plus grand déchet par l'action du feu, quoique ce soit celle qui fasse en apparence le moins d'effervescence avec l'acide nitreux. La dolomie se fond avec

effervescence par la voie sèche dans le borax & dans l'alkali minéral ; elle forme avec ces sels des verres blancs transparens. J'ai projeté successivement 100 grains de dolomie dans du nitre en fusion ; ils n'ont produit ni lumière ni détonation , & le nitre qui les contenoit après une digestion d'une heure à la chaleur rouge n'a pas changé de couleur : il paroît donc que cette pierre ne contient pas de manganèse , & que les autres chaux métalliques qui peuvent entrer dans sa composition sont en très-petite quantité.

Action de l'eau & des acides sur la Dolomie.

Deux livres d'eau distillée ont bouilli pendant deux heures sur 200 grains de dolomie sans en extraire une quantité sensible au poids. Cette eau a été réduite par l'évaporation environ à un huitième de son volume. Dans cet état les solutions nitreuses de mercure & d'argent l'ont à peine troublée , les solutions barotiques & l'acide saccharin y ont fait de légers précipités.

La dolomie pulvérisée & passée au tamis de soie n'est presque pas soluble à froid dans le vinaigre distillé. J'ai employé neuf heures pour la faire dissoudre dans quarante-huit fois son poids de cet acide chauffé au 60° degré du thermomètre de Réaumur , il se séparoit quelques flocons d'argile , qui se redissoient ensuite. La dissolution a été rapprochée par l'évaporation spontanée , en consistance de syrop sans donner d'autres signes de cristallisation que quelques aigrettes soyeuses & déliées qui végétoient le long des parois du vase qui la contenoit. Exposée ensuite à une douce chaleur , je n'ai pu appercevoir aucune cristallisation bien déterminée.

La dolomie en masse humectée d'une goutte d'acide nitreux produit une effervescence à peine sensible à l'œil nud. Lorsqu'elle est pulvérisée , cette effervescence devient plus évidente. Elle se dissout entièrement à froid dans cet acide. La même quantité d'acide nitreux qui dissout dans trois minutes le spath calcaire rhomboïdal emploie six heures à dissoudre la dolomie pulvérisée. Cette dissolution est transparente & sans couleur. Lorsqu'elle a été faite dans un acide nitreux très-étendu , elle est troublée par une petite quantité d'argile ferrugineuse. Elle cristallise par l'évaporation jointe au refroidissement. Si ce dernier est prompt & l'évaporation très-avancée , toute la liqueur se fige en une masse à demi-transparente composée de houpes ou de gerbes étranlées dans leur milieu , & dont les filets sont plus ou moins déliés. Si l'évaporation & le refroidissement sont bien ménagés , l'on obtient des lames transparentes & détachées qui paroissent composées d'aiguilles rangées pour la plupart parallèlement les unes aux autres. Ces aiguilles vues à la loupe paroissent être des prismes à quatre faces , très-comprimés , qui sont terminés ou en biseau ou par des sommets

dièdres. Cette dissolution cristallise plus promptement & plus facilement que celle de la terre calcaire parfaitement pure. Si cette dernière est combinée à une petite quantité d'argile, elle présente les mêmes effets dans la cristallisation avec l'acide nitreux.

La dissolution & l'effervescence de la dolomie dans l'acide marin sont encore plus lentes que dans l'acide nitreux, elle cristallise en pyramides à quatre faces, dont les sommets sont souvent tronqués. Les cristallisations réussissent d'autant mieux que la dolomie contient moins de fer. Le sel est déliquescent, ainsi que celui qui est préparé avec l'acide nitreux.

L'acide vitriolique dissout la dolomie très-promptement avec une effervescence violente & semblable à celle qu'il produit avec le spath calcaire ordinaire. Il se sépare pendant cette dissolution, une sélénite blanche & informe, la liqueur restante filtrée & évaporée à siccité dépose une sélénite soyeuse. L'eau qui a servi à laver & à édulcorer ces résidus séléniteux, laisse par l'évaporation un dépôt considérable, qui lavé & édulcoré de nouveau avec de l'eau distillée donne une dissolution dont le rapprochement fournit des cristaux d'alun bien déterminés. 100 grains de dolomie ont donné 118 grains de sélénite desséchée & 6,2 grains d'argile précipités des cristaux d'alun par l'alkali volatil.

Il étoit important de reconnoître la nature du gaz qui se dégage de la dolomie dans sa dissolution par les acides. J'ai en conséquence traité avec l'acide vitriolique 100 grains de cette pierre à l'appareil pneumatique au mercure, & j'ai obtenu 55 pouces cubiques d'air qui n'étoit autre chose que du gaz carbonique. Il troublait l'eau de chaux, se laissoit absorber par l'eau, par les alkalis caustiques, & rendoit ces derniers effervescens.

La dolomie calcinée traitée à une douce chaleur, à la distillation avec l'acide vitriolique n'a point produit de gaz, si l'on en excepte une petite quantité d'acide sulfureux, qui venoit de l'acide vitriolique même; cette pierre ne contient donc point d'acide spathique.

J'ai cherché à reconnoître la quantité d'eau que contient la dolomie en comparant le déchet qu'elle éprouve par le feu à celui que donne sa dissolution par l'acide nitreux dans un matras dont le col long & étroit est fermé par un bouchon de verre qui ne joint pas assez exactement pour que le gaz dégagé ne puisse se frayer un passage. 100 grains de cette pierre ont perdu par cette opération, 46,4 grains, la même quantité de spath calcaire rhomboïdal 39,5 grains, le marbre blanc statuaire de Carrare 38 grains, & enfin le spath perlé qui se dissout encore plus lentement dans les acides que la dolomie, 40 grains. Ces substances perdoient au feu dans le même ordre 46,2 : 44 : 42,5 : 45,5.

Nous pouvons conclure de ces expériences que la dolomie est une

des substances calcaires qui paroît, contenir le moins d'eau ; mais nous ne déciderons pas qu'elle n'en contient point, parce qu'il est impossible de supposer que l'air fixe nouvellement formé n'entraîne avec lui une partie de celle qui est unie à l'acide, ou même une petite quantité d'acide.

Action de l'eau & des acides sur la Dolomie calcinée.

La dolomie calcinée s'unit avec chaleur à l'eau en produisant les mêmes effets que la chaux vive, & en formant de l'eau de chaux qui se trouble par le contact du gaz acide carbonique. Les trois quarts environ du poids de cette pierre sont solubles dans l'eau. Le quart insoluble n'est autre chose qu'un composé de terre calcaire, d'argile & de fer.

La partie calcaire de la dolomie calcinée se dissout aussi promptement dans les acides que la chaux vive ordinaire. La dissolution est troublée par une certaine quantité d'argile qui reste indissoute suivant la nature ou la concentration de l'acide employé. On peut extraire l'argile de la dolomie calcinée en faisant digérer à une douce chaleur cette dernière substance dans du vinaigre distillé. J'ai obtenu par ce moyen 8 grains d'argile unie à une petite quantité de fer, sur 54 grains de cette pierre calcinée. Lorsque la dolomie n'a pas subi la calcination, on ne peut parvenir à séparer l'argile de la terre calcaire en suivant ce procédé.

Après avoir éteint dans l'eau 54 grains de dolomie calcinée, je les ai exposés dans un lieu sec pendant quatre mois. Au bout de ce tems ils ont acquis un poids de 44 grains, ils se sont dissous alors promptement & avec une violente effervescence dans les acides nitreux, marin & acéteux. La dissolution a toujours été troublée par l'argile qu'elle contenoit. La dolomie calcinée placée sous une cloche remplie de gaz acide carbonique qui reposoit sur du mercure, n'a pas absorbé un atôme de cet acide. Cette pierre calcinée, mais éteinte dans l'eau, s'en est saturée dans les mêmes circonstances. La chaux vive, ainsi que l'a observé M. Bucquer, produit des effets analogues, & ne se sature d'air fixe qu'en raison de la quantité d'eau qui lui est unie.

Analyse de la Dolomie.

J'ai cherché à déterminer par la méthode ordinaire de l'analyse les quantités des différentes substances que contient la dolomie. Je remarquerai à cette occasion que la longue opération de l'analyse des gemmes, telle qu'elle a été décrite par Bergmann, peut beaucoup s'abréger après la séparation préliminaire de la terre féliciteuse, en partageant la dissolution des autres terres par l'eau régale, en autant de portions qu'il y a de principes à reconnoître dans la pierre qu'on examine, pour reconnoître ensuite séparément un de ces principes dans chaque

portion & pour évaluer par des règles de proportion le produit qu'on auroit eu si l'on avoit opéré sur la masse qu'on a soumise à l'analyse.

On évite en suivant cette méthode, plusieurs opérations embarrassantes, qui nuisent d'ailleurs à l'exactitude du travail, & l'on en abrège le tems en faisant simultanément toutes les filtrations, tous les dessèchemens & tous les lavages.

Ainsi après avoir fait dissoudre 400 grains de dolomie dans l'eau régale, j'ai partagé en quatre parties cette dissolution, ce qui se fait sur le champ, lorsqu'on a des vases dont les capacités sont déterminées,

Dans la première portion j'ai formé du sacchate calcaire avec l'acide de sucre, & le poids de ce précipité a indiqué d'après l'évaluation donnée par Bergmann que 100 grains de dolomie en contiennent 44,29 de terre calcaire.

La dissolution de terre vitriolée n'a fait aucun précipité dans la seconde portion, ce qui prouve que cette pierre ne contient point de terre pesante.

L'alkali volatil parfaitement caustique a précipité dans la troisième portion l'argile & le fer, le poids de ces deux substances équivaloit à 6,75 grains.

L'alkali phlogistique a précipité le fer de la quatrième portion. Son poids diminué dans le rapport trouvé par l'expérience préliminaire que conseille M. Kirwan, s'est trouvé de 0,74.

La différence entre le poids de la pierre soumise à l'analyse & celui de la somme des produits que je viens d'obtenir en y comprenant l'air fixe, auroit pu donner la quantité de magnésie contenue dans cette dolomie; mais comme il est plus exact de rendre palpable chaque produit en particulier, j'ai repris la liqueur dont j'avois précipité l'argile & le fer, & j'en ai séparé, 1°. la terre calcaire par l'acide du sucre, 2°. la magnésie seule par l'alkali minéral. Le poids de cette dernière terre équivaloit à 1,4 grains. Donc 100 grains de dolomie contiennent,

Terre calcaire	44,29 grains.
Argile	5,86
Magnésie	1,4
Ecr	0,74
Acide carbonique	46,1
<hr/>	
Somme	98,39
Perte	1,61
<hr/>	
	100
<hr/>	

J'ai recherché si l'argile que contient l'échantillon que j'ai analysé, ne lui étoit point accidentelle, & j'ai trouvé que toutes les autres variétés que je possède en contiennent pour le moins une aussi grande quantité.

L'on a vu que la dolomie s'éloigne par quelques-uns de ses caractères de la nature des pierres calcaires ordinaires, & qu'elle s'en rapproche à tous égards après sa calcination & sa saturation par l'acide carbonique & par l'eau; l'on a reconnu que le gaz qui la sature avant sa calcination est bien de l'acide carbonique, & que la terre qui y domine est calcaire. J'ai cru d'abord que l'absence de l'eau dans la dolomie étoit la seule cause de sa densité & de sa lente solubilité dans les acides; mais un examen plus approfondi m'a persuadé que cette cause elle-même n'étoit que secondaire. En effet, l'on ne conçoit pas pourquoi des pierres calcaires dont la formation est très-antérieure à celle des dolomies qui offrent des débris de coquillages, ne présenteroient pas la même difficulté à se dissoudre, si cet effet pouvoit être chez elles celui d'un simple dessèchement. L'expérience prouve d'ailleurs que l'eau est un intermède nécessaire pour que la terre calcaire puisse s'unir à l'acide carbonique, & que cette combinaison ne s'opère qu'en raison de la quantité d'eau qui y intervient. Il paroît que l'argile est essentielle à la dolomie; il est donc possible que l'argile serve ici d'intermède, & que la dolomie ne soit autre chose que la combinaison de la terre calcaire & de l'argile avec l'air fixe; & que sa lente solubilité soit due principalement à la difficulté avec laquelle le composé de la terre calcaire & de l'argile est attaqué par les acides.

Ces considérations m'ont engagé à rechercher si la combinaison particulière qui est le résultat de la précipitation de l'eau de chaux par l'argile étoit susceptible de s'unir à l'acide carbonique. J'ai à cet effet étendu dans 5 livres d'eau 25 grains d'argile précipitée de l'alun par l'alkali volatil caustique, & je les ai mêlés avec 7 livres d'eau de chaux. Il seroit très-difficile de déterminer le point de saturation de ce composé, qui doit varier toujours en raison de la division de l'argile. Le précipité lavé, édulcoré & filtré a été exposé pendant un mois à l'air libre; il a absorbé le gaz carbonique de l'atmosphère, & il s'est dissous dans les acides nitreux & marin avec une effervescence plus lente que ne le fait la terre calcaire pure.

Je serois porté à croire que la combinaison de l'argile & de la terre calcaire contient une petite quantité d'eau qui lui est essentielle; mais qui ne sauroit être exactement déterminée par nos expériences. Ce composé avant que d'avoir été calciné, est à une douce chaleur entièrement dissoluble dans l'acide acéteux, & à froid dans les acides nitreux & marin; après sa calcination il n'en est plus de même: l'un de ces acides & en particulier le vinaigre dissout seulement la terre calcaire & laisse l'argile libre; probablement

probablement parce que le feu a détruit cette combinaison, en lui enlevant l'eau qui lui étoit essentielle.

Il résulte donc de ces expériences, que la dolomie n'est autre chose qu'une combinaison proprement dite, de l'acide carbonique avec l'argile & la terre calcaire, que la dolomie calcinée n'a pas la propriété de redevenir lentement effervescente par son exposition à l'air libre, parce que l'argile n'est plus chimiquement combinée à la terre calcaire, & parce que cette combinaison ne peut se faire que lorsque l'une des deux terres est dissoute dans un fluide. La dolomie se trouve après la calcination & après la combinaison avec l'acide carbonique dans le cas de certaines marnes calcaréo-argilleuses très-effervescentes, où la terre calcaire & l'argile ne sont point chimiquement combinées.

Examen de la phosphorescence que présentent quelques pierres calcaires par le contact d'un corps chaud.

La lumière qui se dégage de certaines substances minérales par le contact d'un corps chaud est un caractère trop négligé jusqu'à présent, & qui pourroit peut-être à l'aide de l'expérience nous éclairer beaucoup sur leurs parties constituantes.

La dolomie pulvérisée, projetée sur une pelle de fer chauffée au degré qui précède celui de la rougeur, produit une très-belle lumière. Cet effet a lieu sans odeur sensible. La lumière de la dolomie est à-peu-près égale quant à l'intensité & à la durée à celle qui se dégage de la craie dans les mêmes circonstances; mais elle est absolument différente quant à la couleur: la phosphorescence de la craie ainsi que celle du spath-fluor est d'un blanc bleuâtre; celle de la dolomie est d'un rouge orangé très-frappant.

La dolomie qui a produit une fois cet effet n'offre à l'épreuve d'une pelle chauffée presque à la rougeur que quelques signes d'une lumière blanche à peine sensible, après avoir été exposée au soleil pendant plusieurs heures. Cette pierre ne perd point la phosphorescence par l'ébullition avec l'eau distillée.

Je crois qu'on peut distinguer dans les pierres calcaires trois genres de phosphorescence par le contact d'un corps chaud.

Le premier paroît être l'effet de la combustion à l'air libre du soufre ou du foie de soufre que la pierre contient. On distingue cet effet des suivans, parce qu'il est le seul qui requière la présence de l'air extérieur.

Le second paroît être le résultat d'une simple imbibition de lumière; il a lieu toutes les fois qu'on y a exposé la substance à laquelle il appartient. Tous les corps participent plus ou moins à cette propriété, elle est très-frappante dans certains diamans & dans quelques substances préparées à cette fin par la calcination.

Le troisième ne peut se manifester qu'une seule fois dans le même corps, mais il a lieu sans le contact de l'air extérieur, comme dans l'eau, dans le vuide, & dans l'intérieur même de la pierre: telle est la phosphorescence du spath-fluor & de plusieurs pierres calcaires.

L'on s'est beaucoup occupé des deux premiers genres de phosphorescence & peu ou point du troisième. J'ai fait quelques expériences à ce sujet, & il m'a paru que lorsque la phosphorescence des pierres calcaires ne tient ni à une combustion opérée à l'aide de l'air extérieur, ni à l'action de la lumière à laquelle la pierre a été antérieurement exposée, elle est due à la lumière qui se dégage de l'acide qu'elle contient dans l'acte de sa combinaison par la voie sèche avec la substance inflammable ou avec la chaux métallique plus ou moins désoxygénée qui lui est unie & qui est un excès par la voie humide.

Toutes les pierres calcaires douées du dernier genre de phosphorescence dont j'ai parlé donnent, lorsqu'elles ont été traitées convenablement avec de l'eau distillée, les signes de la présence des acides vitriolique ou marin. Comme ce dernier acide paroît être la cause de la phosphorescence d'un très-grand nombre de pierres calcaires, & qu'il ne forme point de soie de soufre avec le charbon, je l'ai choisi pour servir à prouver ce que je viens d'avancer.

L'on voit dans tous les Elémens de Chimie que la combinaison de la terre calcaire & de l'acide marin donne de la lumière sur un fer rouge, mais il m'a paru que lorsque ces deux substances étoient parfaitement pures, cet effet n'avoit jamais lieu.

La terre calcaire aérée très-pure, telle que celle que l'on obtient à la surface de l'eau de chaux par sa précipitation à l'air libre, ou celle de certains spaths d'Islande parfaitement blancs & transparens, ne m'a donné sur un fer chauffé, même à la rougeur, aucune lumière sensible.

J'ai fait dissoudre jusqu'à saturation du spath calcaire parfaitement transparent & non phosphorescent dans de l'acide muriatique ordinaire rectifié. Cette dissolution filtrée a laissé par l'évaporation dans une capsule de verre un résidu blanc & friable qui n'étoit point phosphorescent non plus que le résidu de la dissolution muriatique fait avec excès de terre calcaire pure. Les résidus poussés au feu, jusqu'à la vitrification, n'ont donné aucune lumière dans les mêmes circonstances.

La terre calcaire aérée pure projetée dans le premier résidu lorsqu'il est en fusion, produit une vive effervescence, mais sans phosphorescence. Si au lieu d'ajouter de la terre calcaire pure, on en ajoute une qui soit chargée de fer à demi-oxygéné, on aperçoit à la surface du mélange une très belle phosphorescence, quoique la terre ajoutée n'ait point seule cette propriété. Si l'on sort le mélange du creuset à propos & avant que

la combinaison soit achevée, elle se trouve encore après le refroidissement phosphorescente sur un fer rouge.

Le résidu de l'évaporation de la dissolution muriatique faite avec excès de terre chargée de fer à demi-oxigéné donne toujours à l'aide de la chaleur une très-belle phosphorescence.

Enfin, si dans du muriate calcaire en fusion l'on jette de la limaille de fer, l'acide marin calcine ce métal & s'unit à lui en produisant une lumière phosphorique d'un blanc bleuâtre qui s'élève à plusieurs pouces au-dessus du mélange. Cette lumière transude à travers le creuset qui se trouve lui-même dans une atmosphère bleue. Il se dégage du mélange quelques bulles qui en éclatant à l'air laissent échapper une lumière blanche éblouissante. La chaux noire de manganèse dégage du muriate calcaire en fusion une fumée blanche qui colore en rouge la flamme des charbons.

La lumière produite est toujours en raison inverse de l'oxigénation du métal.

Il paroît d'après ces expériences que l'acide muriatique produit dans ses combinaisons par la voie sèche des effets analogues à ceux que M. Westrumb a obtenus lorsque cet acide est en état de gaz muriatique oxigéné.

Le phosphore d'Homberg ou le muriate calcaire qui est le résultat de la décomposition du sel ammoniac par la chaux vive, ne doit vraisemblablement en grande partie la belle lumière qu'il donne par la chaleur qu'à la décomposition de l'alkali volatil, que le gaz acide muriatique oxigéné peut aussi opérer.

Phosphorescence du Spath-fluor.

Si nous examinons maintenant la phosphorescence du spath-fluor, nous verrons comment ce phénomène & tous les effets qui l'accompagnent doivent être le résultat de la composition chimique de la substance qui le produit. Les spaths-fluors sont d'autant plus phosphoriques qu'ils sont plus colorés, & suivant Romé de l'Isle (Cristallogr. tom. 2), ceux qui sont parfaitement blancs & transparens n'ont point cette propriété. La phosphorescence n'est donc pas essentielle au spath-fluor.

La plupart des spaths-fluors colorés doivent leur couleur à la présence du fer, comme Schéel l'a prouvé (Mémoire de Stockholm, 1771). Donc les spaths-fluors sont d'autant plus phosphoriques qu'ils contiennent plus de fer, ou que ce fer y est dans un état moins oxigéné. Le spath-fluor perd sa couleur avec sa propriété phosphorescente; ce fait sembleroit indiquer une oxigénation plus complète de la chaux métallique qu'il contient. Tant que dure le phénomène il se produit un pétilllement & une décrépitation extraordinaire, qui ne paroît pas dépendre unique-

ment de l'eau de cristallisation & de l'inégale dilatation des surfaces ; car à chaleur égale ce pétilllement est d'autant plus grand que la phosphorescence est plus vive, & il cesse avec elle. J'ai soumis à la phosphorescence dans un creuset bien fermé quatre onces de spath-fluor verd, à demi-transparent du Saint-Gothard. Ces quatre onces ont diminué de 1,25 grains. L'expérience répétée une seconde fois m'a donné le même résultat.

Puisque le spath-fluor perd par la calcination sa propriété phosphorescente & une partie de son poids, il est sûr qu'il se fait un changement dans sa composition : je me suis assuré de la nature de ce changement par les expériences suivantes.

J'ai fait bouillir pendant plusieurs heures une livre d'eau distillée sur 200 grains de spath-fluor non calciné. La liqueur filtrée rapprochée par l'évaporation n'a donné aucun signe de la présence du fer par l'infusion de quelques gouttes de prussite calcaire. La dissolution d'argent & celle de l'acide saccharin ne l'ont pas sensiblement troublée. Le résidu de l'évaporation étoit blanc, il pesoit un demi-grain, & n'étoit point déliquescent ; il paroissoit être du spath-fluor non décomposé.

La même opération a été répétée sur une pareille quantité de spath-fluor calciné jusqu'à la vitrification dans un creuset de platine. Sa dissolution concentrée par l'évaporation a coloré en bleu le prussite calcaire, la dissolution d'argent y a fait un précipité très-apparent, l'acide saccharin l'a troublée, le résidu de cette liqueur évaporée à siccité pesoit 1,5 grains ; il étoit déliquescent, il brunissoit par son exposition à l'air, & il paroissoit être en grande partie un muriate calcaire très-chargé de fer. Ce sel est donc le résultat du changement de combinaison qui s'opère par l'action du feu dans le spath-fluor. Schéele a prouvé (Journ. de Physiq. 1783) que le spath-fluor contient toujours une quantité notable d'acide marin qui devient sensible dans la décomposition de ce spath par l'acide vitriolique.

L'acide spathique a plus d'affinité par la voie humide avec la chaux que n'en a l'acide marin (*Nov. Act. Upsal. tom. II*). Il est donc évident que quand le spath-fluor s'est formé, l'acide spathique s'est emparé de la terre calcaire à l'exclusion de l'acide marin qui n'est combiné ici ni avec cette terre, ni avec le fer, mais avec le spath-fluor proprement dit : car on ne découvre dans ce spath ni muriate calcaire, ni muriate de fer.

Bergmann & Schéele ont démontré que par la voie sèche les affinités de l'acide spathique changent, & que l'acide marin lui enlève la chaux. Il arrive donc que quand on calcine le spath-fluor, l'acide marin s'empare de la chaux & du fer à l'exclusion de l'acide spathique, & qu'il produit par cette union le beau phénomène qui doit l'accompagner. Il en résulte l'oxigénation & la décoloration de la chaux ferrugineuse, & enfin le pétilllement qui est vraisemblablement dû en grande partie au dégage-

ment d'une petite quantité de gaz acide spathique-précipité par l'acide marin.

La phosphorescence par collision paroît, suivant la nature de la substance qui la produit, pouvoir être ou n'être pas subordonnée à celle que l'on obtient par le contact d'un corps chaud. Ainsi la craie phosphorée dont j'ai parlé est très-phosphorique par collision, & elle ne l'est point par la chaleur.

Le spath-fluor dont la surface est grenue, est phosphorique par collision, & il perd en grande partie cette propriété par la calcination.

Il est possible que les deux phosphorescences aient en partie une même cause, lorsque la phosphorescence par la chaleur est sûrement comme dans le spath-fluor le résultat d'une décomposition opérée par la voie sèche, car il est probable que le frottement fait dans ce cas le même effet que l'application d'un corps chaud.

M É M O I R E

Sur cette Question : Les Végétaux ont-ils une chaleur qui leur soit propre, & comment supportent-ils dans nos climats les froids de l'Hiver ?

Par M. JEAN SENEBIER, Bibliothécaire de la République.

C'EST un spectacle assez singulier que celui qui nous est offert par les boutons de la vigne & de diverses plantes, qu'on voit croître, se développer sous leurs écailles, en bravant dans cet état de foiblesse la rigueur de l'hiver; tandis que le gel le plus foible détruit la plupart de ces boutons, quand ils sortent de leurs enveloppes: on est étonné en observant le plus grand nombre de nos arbres affronter des froids de 17 degrés au-dessous de zéro sans périr, & en voyant le bouleau & plusieurs plantes indigènes du nord supporter sans dommage des froids de 25 à 30 degrés au-dessous du point de la congélation.

Le problème paroît d'abord fort embarrassant; la sève qui monte dans les plantes est fort aqueuse; elle se gèle à-peu-près au même degré que l'eau; le lieu où les humeurs de la plante sont les plus abondantes est celui où ces humeurs doivent être le plus exposés au froid; l'immobilité de la plante doit lui faire prendre d'abord la température de l'air ambiant; & la congélation de l'eau renfermée dans l'écorce doit y occasionner mille désordres.